


Lesk a bída substituce

a neb co je dobře





Historie nedávná


- V roce 1998 substituce Metadonem Apolinář
20 osob pilotní fáze
- V roce 2000 vznik dalších Metadonových programů – center
- Praha - 2 programy Apolinář, Dropin
- Mělník - MUDr. K. Hampl
- Ústí nad Labem – Masarykova nem.



Historie nedávná

- Brno – Podané ruce
- Olomouc - MUDr. J. Šmoldasová
- Ostrava – MUDr. J. Potribná
- V síti poskytovatelů pouze 7 center
- Služba méně dostupná

Prokázaná závislost na opiátech



- Užívání opiátů 4 – 5 let
- Věk nad 18 let
- Alespoň 2 pokusy o ústavní léčbu
- Závažné zdravotní obtíže – carcinom, HIV/AIDS, vlivem svého postižení klient nezvládne režim komunity
- gravidita



První dítě na Metadonu

- V r. 1999 1. těhotenství – v metadonovém programu
- Jakub 7 let, 2810 g, míra 47 cm, gest.týden 41,
- Neplánované, ale chtěné těhotenství
- Kojení - ano



Problém

- Syndrom z odnětí se dostaví u novorozenců do 5 dnů po porodu
- Léčba – Opiová tinktura
- Morfin Chloratum, Morfin Sulfatum
0,4 mg/ml – 2,4ml/kg/den
- Dříve – Phenobarbital 6mg – 20mg/kg/den
nedoporučuje se

Subutex – Buprenorfin 2001



- Původně k substituci po ukončení metadonové substituce
- K detoxifikaci u osob na detoxu
- Ambulantní detoxifikace u osob ohrožených na životě před nástupem na léčbu
- Substituce uživatelům na cca 0,75 – 1,5 g pouliční dávky heroinu

Subutexový program v r. 2001



- Alespoň 2 pokusy o ústavní léčbu
- Závažné zdravotní obtíže – carcinom, HIV/AIDS, vlivem svého postižení klient nezvládne režim komunity
- Gravidita
- Stabilní zázemí, práce
- Krátkodobá substituce při porušení abstinence

Preskripce pro všechny odbornosti 2001/2 - nevýhody




- Ne vždy přeně odebraná dlouhodobá AT anamnesa
- Preskripce i při užívání dávky kol. nad 1,5 - 2 g heroinu
- Substituce není dostatečná, Subutex se dostává na černý trh a klienti si kupují heroin
- Substituce není dostatečná a není možné docílit stabilizace



Nevýhody

- Chybí doprovodné psychosociální služby
- Služby nejsou požadovány
- Kontrola přítomnosti dalších NNL a alkoholu
- Nejasný přehled o dávkování
- Znemožnění terapeutické intervence u uživatelů

Výhody



- Celková stabilizace zdravotního a sociálního stavu
- Lze pracovat s osobností
- Lze rozvíjet dovednosti
- Matky mohou pečovat o děti
- Snadno dostupná detoxifikace



Co se osvědčilo

- Spolupráce se substitučními centry
- Spolupráce s lékaři
- Spolupráce lékařů s CPR
Apolinář, Dropin, MUDr. V. Řehák
- Preskripce u praktických lékařů a psychiatrů se u klientek Centra pro rodinu příliš neosvědčila



Děkuji za pozornost

S. Sedláčková

Centrum pro rodinu – Drop In,o.p.s.

cpr@dropin.cz , www.dropin.cz

603 291 593, 271 721 040

Praha 10, Přípotoční 3